

등록번호


성명

성별/나이

진료과

병실

의식하 진정 내시경 동의서



진단명

수술, 시술, 검사명

시행예정일

20 년 월 일

1. 시술/검사의 목적 및 필요성

과거에는 대부분 진정제를 사용하지 않고 내시경 검사를 하여 왔으나 최근에는 환자분들의 편의를 도모하기 위하여 수면내시경을 하기도 합니다. 수면내시경을 위하여 사용되는 약제들은 환자를 어느정도의 진정상태에 도달하게 한 후 검사를 함으로써 검사에 따르는 불편감을 경감시켜주는 효과가 있습니다. 그러나 환자를 마취한 상태로 하는 검사는 아니며 환자의 협조가 가능한 진정 상태에서 도달하지 못하거나 오히려 환자의 협조도가 낮아져 검사 자체가 어려워지는 수도 있습니다.

2. 시술/검사 방법 및 과정

진정제 또는 진통제를 정주하여 환자분의 진정상태를 확인한 후 내시경을 시행합니다. 검사 중에는 항상 환자분의 활력 증후 및 산소 포화도를 주기적으로 확인합니다.

3. 시술·검사 전/후 환자가 지켜야 할 준수 사항(건강관리에 필요한 사항)

검사 및 시술 전 금식: 맑은 물은 2시간, 우유 및 가벼운 유동식은 6시간, 그 외는 8시간의 금식이 필요합니다.

의식하 진정 처치 후에는 완전한 회복을 위하여 안정이 필요하며 처치 당일에는 운전은 피하고 중요한 약속이나 업무는 피해야 합니다. 어지럼증으로 인한 낙상을 예방하기 위해 충분히 안정을 취하고 반드시 보호자가 동행해야 합니다.

4. 시술/검사로 발생 할 수 있는 합병증 및 후유증

- 호흡곤란, 저산소증 심혈관계 합병증(맥박수 증가) 낙상 진정상태 미 도달
 기타

극히 드물지만 호흡과 심장이 정지되어 위험한 상황이 발생하기도 하며, 과민반응이 나타나서 응급조치가 필요한 경우도 있습니다. 따라서 호흡기 질환으로 폐기능 장애가 있거나, 신장이나 심장질환이 있는 경우에는 의식하 진정 시 주의를 요합니다.

5. 시술/검사 이외의 시행 가능한 다른 치료방법

의식하 진정 내시경은 환자가 내시경의 고통으로부터 벗어나기 위해서 시행하는 것으로서 환자가 원할 경우만 시행 합니다. 그러므로 다른 치료방법은 일반내시경을 하시면 됩니다.

6. 예정된 의료행위(치료)를 하지 않을 경우의 결과

정확한 진단 및 치료에 제한이 있을 수 있습니다.

20 년 월 일 시 분

* 설명의사 : _____ (서명 또는 날인)

* 환자명 : _____ (서명 또는 날인)

휴대전화 _____

* 대리인 : _____ (서명 또는 날인)

환자와의 관계 : 환자의 _____

생년월일 : 년 월 일

휴대전화 _____

* 대리인이 서명하게 된 사유

- 환자의 신체·정신적 장애로 인하여 약정 내용에 대하여 이해하지 못함
- 미성년자로서 약정 내용에 대하여 이해하지 못함
- 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 나쁜 영향을 미칠 것이 명백함
- 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임함
(이 경우 별도의 위임서 계약서를 본 동의서에 첨부 하여야 합니다)
- 기타 _____